




<b>Nom Instrucció</b>	IT_TSNU_04 Serveis coronavirus_v2		
<b>Revisió</b>	02	<b>Data</b>	13-04-2020
<b>Classificació</b>		<b>Estat</b>	
Intern		Definitiu	
	<b>Nom i Cognoms</b>	<b>Signatura Digital</b>	
<b>Realitzat</b>	Yuri Lázaro Àmbit Emergències		
<b>Revisat</b>	Pere Sanchez Sots Cap Barcelona Nord		
<b>Aprovat</b>	David Pomés CAP Àrea TSNU		
<b>Aprovat</b>	Anna Fontquerni CAP Territorial Girona	16/04/2020	
<b>Aprovat</b>	Àngels Lopez CAP Àmbit Emergències		
<b>Aprovat</b>	Mireia Campos Responsable PRL		

### Control de Distribució

Còpia	Nom i Cognoms	Càrrec
1	Àgora	Gestor documental

### Registre de canvis

Versió	Data	Pàgines afectades	Notes i motius del canvi
1		Totes	Versió inicial
2	07/04/2020	- Pàgina 3 de 6 (punt 6.3.b. i per "i-o") - Pàgina 4 de 6 (punt 7.1.4. bata 6B per bata).	- Error de transcripció. - Unificació de criteris.



## 1. Objectius

És objecte d'aquesta instrucció descriure l'actuació que realitzaran els professionals del TSNU, en realitzar un servei amb un pacient que està en estudi o és un positiu confirmat o probable pel coronavirus SARS-CoV-2.

## 2. Abast o Àmbit d'aplicació

- Àrea TSNU del SEM
- Central de Coordinació Sanitària del SEM (CECOS)
- Responsables territorials del SEM
- Adjudicatari i els seus centres de coordinació
- Centres Prescriptors

## 3. Definicions/Observacions

- Precaucions per evitar la transmissió de Coronavirus SARS-CoV-2

El coronavirus es transmet principalment per les gotes respiratòries de més de 5 micres i pel contacte directe amb les secrecions dels pacients infectats. També es podria transmetre per aerosols en procediments terapèutics que els produeixin.

Les precaucions adequades per al maneig dels pacients en investigació o confirmats per laboratori d'infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 inclouen les precaucions estàndard, precaucions de contacte i precaucions de transmissió per gotes.

- Exposició de Baix Risc

Es consideren de baix risc les exposicions puntuals de <15 minuts amb mínim contacte físic a menys de 1.5mts, per exemple entregar medicació o safata de menjar, prendre constants.

- Exposició d'Alt Risc

Es consideren d'alt risc les exposicions en serveis realitzat sense EPI, ni els professionals sanitaris ni els pacients (COVID+) o pacient en sospita, de més de 15 minuts de contacte.

## 4. Documentació de referència

Aquesta instrucció amplia la informació del procediment PR\_TSNU\_08 Serveis amb origen i-o destí zona d'aïllament, en els casos de trasllat de pacients afectats o amb sospita del COVID19.



## 5. Responsabilitats

### a. Execució

- Unitats del TSNU
- Centres Coordinadors de les empreses adjudicatàries
- Central de Coordinació Sanitària del SEM

### b. Supervisió

- Empreses adjudicatàries i les seves unitats de PRL.
- Central de Coordinació Sanitària del SEM
- Àrea TSNU del SEM
- Responsables Territorials

## 6. Descripció de les activitats

- 1- Els vehicles que realitzin aquests serveis, contindran únicament el material imprescindible per efectuar el servei, amb la finalitat de facilitar la posterior neteja i desinfecció.
- 2- Els vehicles utilitzats en aquests serveis han de tenir separació entre cabina de conducció i cabina assistencial
- 3- Aquest tipus de serveis es podran realitzar amb unitats tipus A1 o A2 , únicament es podrà realitzar un trasllat col·lectiu quan:
  - a. Tots els pacients són positius confirmats
  - b. Tots els pacients tinguin el mateix origen i-o el mateix destí
  - c. El servei hagi estat acceptat per CECOS.
- 4- La Central de Coordinació en el moment d'assignar el servei a la unitat, li comunicarà que es tracta d'un pacient que està en estudi o és un positiu confirmat o probable pel coronavirus SARS-CoV-2.
- 5- Els professionals que realitzin aquests serveis faran ús de les mesures d'autoprotecció habituals (mascareta i guants, bata i protecció ocular especificada a l'annex I) i evitaran al màxim el contacte amb el pacient.
- 6- En cas de serveis en els que el pacient necessiti subministrament d'oxigen, aquest es realitzarà amb ulleres nasals o mascaretes tipus Monhagan ®
- 7- L'EPI del pacient i acompanyant si és el cas, serà el mateix que ha utilitzat al centre hospitalari.
- 8- Mai s'usaran EPI en la cabina de conducció.
- 9- Els serveis seran sense acompanyant, a excepció que sigui imprescindible, en aquest cas excepcional, l'acompanyant anirà a la cabina assistencial, també amb mascareta quirúrgica.
- 10- L'acompanyament del pacient es realitzarà, sempre que sigui possible, mantenint la distància mínima de seguretat per evitar la transmissió, actualment recomanació d' 1'5 metres de distància mínima.
- 11- La mobilització del pacient es realitzarà evitant al màxim el contacte directe amb el pacient i, sempre que sigui possible, per l'esquena.
- 12- Una vegada finalitzat el servei, es procedirà a la neteja i desinfecció del vehicle segons els procediments establerts.

## emergències mèdiques



13- Els serveis s'hauran de sol·licitar pels canals habituals amb l'adjudicatari, especificant que es tracta d'un cas en estudi, probable o confirmat de COVID19.

14-

### 7. Annexos

#### 7.1. Annex I, Mesures d'autoprotecció

Els trasllats d'aquests pacients s'ha de realitzar garantint la seguretat del pacient i les màximes mesures de protecció del personal sanitari implicat. El coronavirus es transmet principalment per les gotes respiratòries de més de 5 micres i pel contacte directe amb les secrecions infectades (encara que, de moment, no existeix evidència de transmissió aèria). Per tant, les precaucions aniran en aquest sentit:

- Precaucions estàndard
- Precaucions basades en la transmissió per contacte, gotes i via aèria.

A continuació detallem les recomanacions mínimes a seguir, que s'aniran revisant segons es disposi de més informació sobre la malaltia i els seus mecanismes de transmissió.

- En tots els casos, cal demanar al pacient que es col·loqui la mascareta quirúrgica.

- El personal sanitari que atengui casos en investigació, probables o confirmats per infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 han de portar un equip de protecció individual per a la prevenció d'infeccions:

1. Mascareta quirúrgica

2. Protecció ocular ajustada de muntura integral o protector facial complet (pot ser reutilitzada si es desinfecta correctament).<sup>1</sup>

3. Guants.

4. Bata de protecció.

En cas d'ús de pantalla facial, la mascareta quirúrgica o FFP2 es poden reutilitzar, sempre i quan ens rentem les mans abans i després de manipular-les

Les precaucions universals tenen per objecte reduir el risc de transmissió d'agents patògens transmesos per la sang i altres tipus d'agents patògens de fonts tant reconegudes com no reconegudes. Són les precaucions bàsiques per al control de la infecció que s'han d'utilitzar, com a mínim, en l'atenció de tots els pacients. Aquestes impliquen l'ús de pràctiques de treball segures i barreres de protecció, inclosa la higiene de mans i la utilització d'EPIs.

- S'ha de mantenir una estricta higiene de mans abans i després de l'atenció al pacient i abans i després de la retirada de l'equip de protecció individual.

---

<sup>1</sup> Tot i que en la Guia d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 en aquest supòsit no inclou ulleres de protecció, mantenim aquest element.

## emergències mèdiques



- Abans i després de qualsevol contacte directe amb pacients i entre pacients, es facin servir o no guants.
- Immediatament després de treure's els guants.
- Després de tocar sang, fluids orgànics, secrecions, excrecions, pell lesionada i elements contaminats, encara que s'estiguin fent servir guants.
- Durant l'atenció de pacients, en moure's d'un lloc contaminat a un no contaminat del cos del pacient.
- Després del contacte amb objectes inanimats als voltants immediats del pacient.
- S'ha d'evitar tenir contacte amb sang, fluids orgànics, secrecions, excrecions, mucoses i pell lesionada, en qualsevol cas es farà sempre amb guants.
  - Canviar-se els guants entre tasques i procediments en el mateix pacient després del contacte amb material potencialment infecciós.
  - Treure'ls després de l'ús, abans de tocar elements i superfícies no contaminades i abans d'anar a un altre pacient. Fer higiene de les mans immediatament després de treure-se'ls.
- S'utilitza mascareta i protecció ocular (visor ocular, ulleres protectores) o un protector facial, per a protegir les membranes mucoses dels ulls, el nas i la boca durant activitats que poden generar esquitxades o líquids polvoritzables de sang, fluids orgànics, secrecions i excrecions.

El transport del pacient s'ha d'efectuar en una ambulància amb la cabina del conductor físicament separada de l'àrea de transport del pacient. El personal que intervingui en el transport n'ha de ser informat prèviament i ha d'anar amb un equip de protecció adequat seguint les mesures estàndards i les específiques de contacte i gotes (bata, mascareta, protecció ocular i guants).

Serà recomanable activar a la unitat corresponent SOLS per telèfon i no utilitzaran el trunking i fer recordatori de les mesures de protecció que s'han d'utilitzar.

Un cop el pacient ha estat transferit a l'hospital o al domicili en casos concrets, la unitat ha de realitzar el procediment pertinent de neteja i desinfecció, mantenint l'EPI utilitzat durant el trasllat. S'ha de realitzar la neteja i desinfecció de les superfícies amb què ha estat en contacte el pacient, un metre al voltant i sobretot zones de contacte habitual, com pot ser tirador de farmabox, calaixos, etc. La neteja es realitzarà com estableix el procediment de SEM de neteja d'unitats. És important procedir sempre a l'ús del detergent per eliminar tots els residus orgànics, visibles i no visibles no vaporitzant a prop de les superfícies per evitar generar aerosols amb residus dipositats; i en segon lloc procedir a la neteja amb el desinfectant clorat d'alt nivell o amb una solució d'hipoclorit sòdic que contingui 1000 ppm de clor actiu (dilució 1:50 d'una lleixiu amb concentració 50 gr/litre preparada recentment) (PR\_048 Actuació davant demandes d'afectats amb sospita d'alguna malaltia transmissible emergent d'alt risc, Pàgina 25, de 25 Gener 2020).

Abans de procedir a la retirada dels EPI, cal comprovar que disposem de contenidors de grup III (contenidors negres).

## emergències mèdiques



El material utilitzat en l'assistència, (bata i guants) seran considerats residus de classe III, i s'hauran de dipositar en un contenidor habilitat per aquest tipus de residus (contenidors negres).

S'ha de mantenir una estricta higiene de mans abans i després de l'atenció al pacient i de la retirada de l'equip de protecció individual, tant amb aigua i sabó, com amb solució hidroalcohòlica.